

Вопросы и ответы о вакцинации против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекции)



Дорогие родители!

- Мы хотим обратить ваше внимание на необходимость вакцинации против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ-инфекция) для ваших дочерей.

- Возможно, сейчас Вы обеспокоены вопросом – стоит ли делать эту прививку ребенку или нет. Надеемся, что Вы поймете важность

данной вакцинации и примите осознанное решение.

Что такое вирус папилломы человека (ВПЧ)?

Вирус папилломы человека – это группа вирусов, которые поражают слизистые оболочки и кожу различных частей тела. Известно более 200 типов ВПЧ, каждому из которых присвоен определенный номер, обозначаемый в порядке обнаружения.

Чем опасен ВПЧ?

ВПЧ является наиболее распространенным вирусным возбудителем инфекций репродуктивного тракта, вызывая целый ряд заболеваний у мужчин и женщин, в том числе предраковые поражения, которые могут трансформироваться в рак.

Не менее 14 типов ВПЧ известны как типы высокого онкогенного риска, поражают слизистые и могут вызвать рак шейки матки (РШМ) и рак других локализаций. Наиболее онкогенным считается ВПЧ 16 типа. Практически все РШМ, большинство случаев рака влагалища, вульвы и полового члена, некоторые случаи рака головы и шеи вызваны ВПЧ.

В Беларуси ежегодно выявляется около 1000 новых случаев РШМ. Каждые два дня в Беларуси заболевает РШМ пять женщин, и каждый день эта болезнь уносит жизнь одной женщины. Среди гинекологических онкозаболеваний в Республике Беларусь РШМ на втором месте. Риск развития рака у женщин, инфицированных ВПЧ, возрастает более, чем в сто раз.

Также ВПЧ вызывает появление генитальных бородавок, которые легко распространяются и могут плохо поддаваться лечению.

Как передается ВПЧ?

Вирус передается от человека к человеку следующими путями:

- половой путь;
- контактно-бытовой путь – через рукопожатия, поцелуи, через повреждения на коже;
- вертикальный путь – от матери к ребенку во время прохождения ребенка через родовые пути;
- «самозаражение» – ВПЧ переносится с одного участка тела на другой при бритье или эпиляции.

- ВПЧ-инфекция в большинстве случаев протекает бессимптомно. У некоторых людей ВПЧ-инфекция:
 - предраковые состояния (высокоонкогенные типы вируса);
 - остроконечные кондиломы (низкоонкогенные типы ВПЧ-6 и -11);
 - рецидивирующий респираторный папилломатоз гортани (низкоонкогенные типы ВПЧ-6 и -11).

Вакцины для предупреждения ВПЧ-вакцины, лицензированные по состоянию на 01.01.2025

Количество и типы ВПЧ, входящие в состав вакцины	Наименование	Производитель	Дата лицензирования
Бивалентные вакцины: ВПЧ-16,18	Cervarix	GlaxoSmithKline, Великобритания	2007 г.
	Cecolin	Xiamen Innovax Biotech, Китай	2019 г.
	Walrinvax	Yuxi Zerun, Китай	2022 г.
Квадривалентные вакцины: ВПЧ 16,18 ВПЧ 6,11	Gardasil	Merck & Co, США	2006 г.
	Cervavax	Serum Institute of India, Индия	2022 г.
Нановалентная вакцина: ВПЧ 16,18,45,33,31,53,58 ВПЧ 6,11	Gardasil 9	Merck & Co, США	2014 г.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок вакцинация против ВПЧ-инфекции проводится девочкам в возрасте 11 лет. Вакцина Cecolin® (Цеколин).