


Лихорадка Зика вирусное инфекционное заболевание



ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ

передается через укусы зараженных комаров рода *Aedes*, в основном вида *Aedes aegypti*. Обычно комары рода *Aedes* кусают в дневное время, пик их активности приходится на раннее утро, конец дня и вечер



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

инкубационный период (с момента контакта с вирусом до появления симптомов) болезни, вызванной вирусом Зика, точно не известен, но, вероятно, составляет несколько суток.

Симптомы заболевания: повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно слабо выражены и сохраняются 2–7 дней



ПРОФИЛАКТИКА

носить одежду, закрывающую тело;
применять физические барьеры, например, сетки на окнах, закрывать двери и окна, использовать противомоскитную сетку во время сна;
применять репелленты (согласно инструкции).
уничтожать комаров и места их размножения.



СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

в странах
Североамериканского,
Южноамериканского
и Азиатско-Тихоокеанского
региона: Барбадос, Боливия,
Бразилия, Кабо-Верде,
Колумбия, Эквадор,
Сальвадор, Фиджи,
Французская Гвиана,
Гваделупа, Гватемала,
Гайана, Гаити, Гондурас,
Мальдивы, Мартиника,
Мексика, Новая Каледония,
Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Самоа,
Соломоновы острова,
Суринам, Таиланд,
Венесуэла

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

вирусная инфекция Зика во время беременности может приводить к рождению детей с микроцефалией и другими врожденными пороками развития, а также к преждевременным родам и выкидышу

